

Распространенные формы дифтерии (средней тяжести)

5.2. Распространенные формы (средней тяжести):

- дифтерия ротоглотки - интоксикация умеренная, боль при глотании не затрудняет прием пищи, налеты распространяются на небные дужки, нижние отделы мягкого неба, боковые и заднюю стенки глотки, региональный лимфаденит умеренный, токсического отека слизистых оболочек ротоглотки и подкожной клетчатки шеи нет;

- дифтерия носа - распространение налетов в придаточные пазухи носа;

- дифтерия глаз (редкая локализация) - кератоконъюнктивит;

- дифтерия гениталий (редкая локализация) - налеты за пределами вульвы и головки полового члена

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача России от 06.03.2002 № 8 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика дифтерии. СП 3.1.2.1108-02" (вместе с "СП 3.1.2.1108-02. 3.1.2. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции дыхательных путей. Профилактика дифтерии. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом России 20.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2002 № 3439)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/27761/>