

Локализованные формы дифтерии (легкие)

5.1. Локализованные формы (легкие):

- дифтерия ротоглотки - кратковременное повышение температуры от субфебрильной до 38 - 39 град. С, боль при глотании не затрудняет прием пищи, неяркая гиперемия слизистой ротоглотки, умеренный отек миндалин и небных дужек, пленчатые налеты на миндалинах, умеренно увеличенные и слабо болезненные региональные лимфоузлы; при дифтерии налеты однородно фибриновые, в начале формирования - рыхлые паутинообразные либо желеобразные (прозрачные или мутнеющие), легко снимаются, сформированные налеты - плотные, снимаются с трудом и кровоточивостью;

- дифтерия носоглотки - кратковременное повышение температуры, затруднение носового дыхания, увеличение заднешейных лимфоузлов, обнаружение налетов при задней риноскопии;

- дифтерия носа - затруднение носового дыхания и сукровичные выделения, чаще односторонние, катарально - язвенное воспаление или фибриновые пленки, изначально появляющиеся на перегородке носа;

- дифтерия глаз (редкая локализация) - резкий отек век, обильное слизисто - гнойное отделяемое, гиперемия конъюнктивы, пленка на конъюнктиве одного или обоих век;

- дифтерия гениталий (редкая локализация) - катарально - язвенный или фибринозно - некротический уретрит или вульвит;

- дифтерия пищевода и желудка (редкие локализации) - фибринозно - некротический эзофагит и гастрит

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача России от 06.03.2002 № 8 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика дифтерии. СП 3.1.2.1108-02" (вместе с "СП 3.1.2.1108-02. 3.1.2. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции дыхательных путей. Профилактика дифтерии. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом России 20.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2002 № 3439)

Оформите подписку на материалы сайта со скидкой 50% по промокоду: **PDF50**

Предложение действует ограниченное время.

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/7218/>