

Туляремия

2.1. Туляремия - природноочаговая зоонозная инфекция, широко распространенная на территории России в пределах умеренного климатического пояса Северного полушария. У человека - это острое инфекционное заболевание токсико-аллергического, реже септического характера; инкубационный период, как правило, составляет 3 - 7 дней; заболевание продолжается 2 - 3 недели (иногда дольше), в ряде случаев может рецидивировать. Для туляремии наряду с общими проявлениями болезни - повышением температуры тела, головной болью, слабостью и другими симптомами, характерно воспаление лимфатических узлов и прилежащей к ним ткани (образование бубона), возникающих регионарно к месту проникновения в организм возбудителя

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача России от 31.05.2010 № 61 "Об утверждении СП 3.1.7.2642-10" (вместе с "СП 3.1.7.2642-10. Профилактика туляремии. Санитарно-эпидемиологические правила") (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2010 № 17745)

Туляремия - зоонозная системная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, характеризующаяся симптомами общей интоксикации, лихорадкой, воспалительными изменениями в области ворот инфекции, регионарным лимфаденитом, склонностью к затяжному течению

Источник: " МУК 4.2.2939-11. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Порядок организации и проведения лабораторной диагностики туляремии для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней. Методические указания"

(утв. Роспотребнадзором 14.07.2011)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8534/>