

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Цепень карликовый

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Цепень карликовый

Цепень карликовый – плоский ленточный гельминт, вызывающий гименолепидоз. Симптомы включают понос, запоры, боли в животе, головные боли, бессонницу и повышение температуры. Вода может заражаться яйцами размером 40–50 мкм с нитевыми придатками; они сохраняют инвазионность несколько суток. Заражающая доза – 3-5 экз. Узнайте о диагностике, профилактике и эффективных методах обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.

<https://alexeyborisov.ru/enc/1653/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф